



Dzieci z zaburzeniami SI



Autyzm



Całościowe zaburzenie rozwojowe, które objawia się problemami w komunikowaniu uczuć w związkach społecznych oraz zaburzoną integracją sensoryczną



Dziecko z zaburzeniami zmysłu smaku



- Nadwrażliwość
- Niedowrażliwość (podwrażliwość)



◀ Zmysł smaku (niedorażliwość) ▶

- Wkłada przedmioty do buzi, ✕
- Spożywa produkty niejadalne, trujące
- Częste wypryski, zajady w okolicach ust




Jak pomóc ?



- Słojeczki z jedzeniem (stymulacja)



Zmysł smaku - nadwrażliwość



- Przejawia dużą wybiórczość pokarmową
- Jest ściśle określoną konsystencją
- Odruch wymiotny podczas posiłków
- Często choruje

Jak pomóc dziecku z nadwrażliwością



smakową?

- Dietetyk (plan rozszerzania diety)
- Nie zmuszać do jedzenia tego co wszyscy (własne jedzenie)



Zmysł wzroku



- Nadwrażliwość
- Niedowrażliwość (podwrażliwość)



Niedowrażliwość zmysłu wzroku



- Manewruje rękoma w okolicy oczu
- Wpatruje się z bliska w migające zabawki
- Zwraca się ku źródłom światła
- Prace plastyczne pstrokate, pełne kolorów



Jak pomóc?

- Wymienić zabawki z pulsujących do łagodnie przechodzących barw

- Okulary
- przeciwsłoneczne

- Klepsydry wodne
- Płytki barwne

-
-



Nadwrażliwość



- Unika migające zabawki, światła
- Zasłania oczy przy ostrym świetle
- Jest niespokojne w słoneczne dni
- Prace plastyczne stonowane i ubogie
- Unika ruchliwych miejsc

Jak pomóc dziecku z nadwrażliwością wzroku?



- Opuszczamy rolety w słoneczne dni
- Okulary przeciwsłoneczne na zewnątrz (w upalne dni również w sali)
- Sadzamy tyłem do okna



Zmysł słuchu - podwrażliwość



- Dziecko nieustannie produkuje dźwięki, uporczywe dla otoczenia
- Poszukiwanie źródeł dźwięku, przytulanie do głośników
- Może prowokować bójki w celu wywołania hałasu
- Preferuje zabawki dźwiękowe



Jak pomóc?



- Tomatis, Johansen (stymulacja słuchowa)
- Muzyka (słuchawki)
- Zagadki słuchowe
- Instrumenty w czasie zabawy na określony czas (timer)

Nadwrażliwość słuchowa



- Izoluje się od innych
- Wszystkie dźwięki otoczenia słyszy w podobnym natężeniu
- Generuje własne dźwięki, żeby zagłuszyć nieprzyjemne
- Lękliwe w reakcji na nagłe dźwięki
- Gwałtowne reakcje na nagłe dźwięki
- Niepokojne, pobudzone w grupie
- Ma problemy z koncentracją
- Uderza się po głowie lub okolicach uszu

Jak pomóc?



- Słuchawki wyciszające
- System FM (radiowy)-dofinansowanie w przypadku zaburzenia przetwarzania słuchowego


Węch - niedowrażliwość



- Nie czuje, lub osłabione czucie zapachów odczuwanych przez resztę otoczenia
- Obwąchuje siebie i innych
- Poszukuje intensywnych zapachów (kał, benzyna)



Jak pomóc?



- Stymulacja węchowa



Zmysł węchu - nadwrażliwość



- Wyczuwa zapachy, których otoczenie nie czuje
- Izoluje się grupy, gdzie jest różnorodność zapachowa
- Częste odruchy wymiotne
- Duża wybiórczość pokarmowa
- Ucieczki od stołu podczas posiłku

Jak pomóc?



- Nie używamy intensywnych perfum i nie zmieniamy często zapachów
- Siedzimy z brzegu stołu
- Pozwalamy na własne jedzenie

Nadwrażliwość węchowa



- Stymulacja węchowa (najpierw łagodne zapachy)



Niedowrażliwość dotykowa



- Nie zwraca uwagi na skaleczenia i siniaki
- Samo się stymuluje: gryzie, uderza, rozdrapuje do krwi, szczypie się
- Przenosi powyższe zachowania na innych, aby siebie dostymulować lub sprawić innym przyjemność

Jak pomóc?



- Masaże
- Obserwacja czy nie ma rany



Nadwrażliwość dotykowa



- Przywiązuje się do swoich ubrań, nie lubi nowych rzeczy
- Źle znosi zmiany temperatur
- Niechętnie uczestniczy w zajęciach grupowych
- Nie lubi wyjść grupowych
- Czuje się bezpiecznie w ramach, które sobie same stworzą
- Nie lubi zajęć brudzących ręce – klej, plastelina, farby



Jak pomóc?



- Obcinanie metek
- Chwytywanie innego dziecka przez rękaw lub rękawiczkę
- Masaż
- Krzeselko lub poduchy

Czucie głębokie - niedowrażliwość



- Zwiększona potrzeba stymulacji SI
- Chęć ruchu, szukanie nowych doznań
- Zwiększone napięcie mięśniowe
- Trudności koordynacyjne (schody)
- Mocne ściskanie innych

Czucie głębokie - nadwrażliwość



- Zawroty głowy
- Utrata równowagi
- Niechętnie uczestniczy w zabawach grupowych
- Niechęć do karuzeli, huśtawek
- Możliwy lęk wysokości

